GEMFIBROZILO

Tabletas

COMPOSICIONCada TABLETA de GEMFIBROZILO LA SANTE® contiene 600 mg de gemfibrozilo.
PROPIEDADES FARMACOLOGICAS"GEMFIBROZILO LA SANTE® es un medicamento efectivo principalmente indicado para disminuir la concentración de triglicéridos en el plasma de pacientes con hiperlipidemia y riesgos asociados de morbilidad y/o mortalidad. GEMFIBROZILO LA SANTE® también puede disminuir las concentraciones plasmáticas del colesterol total y del colesterol de las lipoproteínas de baja densidad (LDL y VLDL). Adicionalmente, GEMFIBROZILO LA SANTE® tiene la propiedad de aumentar el colesterol de las lipoproteínas de alta densidad (HDL), comúnmente denominado “colesterol protector”. MECANISMO DE ACCION: El mecanismo de acción de este fármaco no está bien establecido; sin embargo, se sugiere que GEMFIBROZILO LA SANTE® inhibe la incorporación de las cadenas largas de ácidos grasos a los nuevos triglicéridos e inhibe la lipólisis basal del tejido adiposo y disminuye la captación de ácidos grasos libres del plasma por el hígado. FARMACOCINETICA: GEMFIBROZILO LA SANTE® se absorbe bien en el tracto digestivo alcanzando concentraciones pico en sangre 1-2 horas después de su administración. GEMFIBROZILO LA SANTE® es eliminado en un 70% por vía renal."
INDICACIONES"GEMFIBROZILO LA SANTE® está indicado en trastornos primarios graves del metabolismo de los lípidos con aumento predominante de los triglicéridos cuando no ha sido efectivo el tratamiento con dieta u otras modificaciones del estilo de vida: • Prevención de enfermedad arterial coronaria y de infarto del miocardio en pacientes con hipercolesterolemia familiar, dislipidemia mixta o hipertrigliceridemia familiar (hiperlipoproteinemias tipo IIa, IIb y IV de la clasificación de Frederickson). • Tratamiento de otras dislipidemias primarias como la de los tipos III y V de la clasificación de Frederickson. GEMFIBROZILO LA SANTE® también está indicado en casos de aumento secundario grave de los triglicéridos, cuando el tratamiento de la enfermedad primaria, la dieta y los cambios en el estilo de vida no han sido efectivos (por ejemplo, en casos de diabetes mellitus o de gota)."
CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS"Hipersensibilidad al medicamento, disfunción hepática y/o renal, colecistitis. La seguridad del medicamento en embarazo y lactancia no ha sido establecida. GEMFIBROZILO LA SANTE® no debe administrarse en niños. Adminístrese con precaución en pacientes con antecedentes de litiasis biliar y/o que estén recibiendo anticoagulantes."
EFECTOS ADVERSOS"Puede producir irritación del tracto gastrointestinal: Dolor abdominal, dolor epigástrico, diarrea, náusea, vómito y flatulencia. Otras reacciones secundarias reportadas son: Reacciones alérgicas, cefalea, mareo, somnolencia, visión borrosa y dolor en las extremidades."
INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS"En la administración de GEMFIBROZILO LA SANTE® con anticoagulantes deberán vigilarse los efectos de estos últimos, valorando el tiempo de protrombina. No se recomienda la administración conjunta de GEMFIBROZILO LA SANTE® con fármacos del grupo de las estatinas dado que incrementa el riesgo de miopatía severa."
POSOLOGIA Y DOSIFICACION"GEMFIBROZILO LA SANTE® se administra por vía oral 1 tableta de 600 mg cada 12 horas, 30 minutos antes de las comidas."
PRESENTACION"GEMFIBROZILO LA SANTE® tabletas por 600 mg, caja por 20 (Reg. San. INVIMA M-003466)."